

Fauna que encontramos en nuestro Restaurant

Como hemos señalado en múltiples oportunidades, queremos que las visitas de nuestros clientes sean una experiencia, donde tan importante como la comida sea el servicio el agrado de estar en nuestro restaurant. Por nuestra ubicación sobre el mar se nos presenta la oportunidad de ver e interactuar de manera directa con la fauna que vive en nuestra costa. Siempre es de mucho interés de parte de los clientes conocer nombres y comportamientos de aves que se paran justo para compartir con nuestros comensales. Para tratar de orientar un poco colocamos algunas de las especies más importantes que se pueden apreciar desde el restaurant. Estas son las siguientes:

- **Pelicano:** Habita las costas del Pacífico del Perú y Chile, llegando por el sur hasta el Canal de Beagle frente a la isla Picton. Mide 1.1 metros de largo y sus alas pueden alcanzar una envergadura que sobrepasa los 2.28 m. Posee un gran pico de color amarillo con una bolsa debajo (llamada bolsa gular) que utiliza para capturar y guardar los peces con que se alimenta. Su plumaje es de color pardo oscuro en el dorso mientras que su frente, pecho y cuello son de color blanco. La parte dorsal de este último, se torna parda durante el período reproductivo. Muy sociables cuando se les proporciona alimentos.



- **Gaviotín Monja:** El gaviotín monja mide unos 40 centímetros de longitud. Es en general de color gris pizarra oscuro, algo más claro en la garganta y bajo las alas. Desde la comisura del pico aparece una línea blanca que pasa por debajo del ojo y se remata con plumas blancas rizadas hacia fuera. El pico es rojo con la comisura amarilla. Las patas son rojas. Las alas son de color negro parduzco, con las secundarias bordeadas de blanco, de manera que forman una línea visible en la mitad del ala cerrada. La cola es también negra parduzca. Se alimenta de pequeños peces que captura zambulléndose en el mar. En ocasiones forman grandes bandadas. Anida preferentemente en grietas o cavidades entre las rocas. La nidada consta generalmente de 2 huevos, de tonos café con leche con manchas más oscuras y negras. Habita en las zonas rocosas del litoral de Perú y de las islas adyacentes, visitando las costas chilenas.



- **Gaviota de Franklin:** La Gaviota de Franklin es una gaviota pequeña (35 cm) se caracteriza por su capucha de un color negro intenso con anteojeras blancas, patas y pico rojo oscuro con punta terminal negra. Tiene las alas grises, con las puntas con salpicado de blancos y negros. Se alimenta de insectos, animales marinos y lombrices. Los juveniles tienen una capucha incompleta. Es una especie migratoria del interior de Norte América. Migra en bandadas hasta de un millón de individuos, formando las bandadas migratorias más grandes de gaviotas que se conocen. Vive en grandes colonias en lagos y humedales desde el sur de Canadá hasta Dakota del Sur y Minesota. Comienza a llegar al Perú desde Agosto siendo Octubre el mes de llegada de las grandes bandadas, ocupando toda la costa de Perú y Chile. Entre las gaviotas, las Franklin son las campeonas de la migración de largas distancias. Después de anidar en las praderas norteamericanas, tienen una muda de plumaje completo. Luego vuelan hacia el sur a la costa de Texas y continúan hasta la costa del caribe de México al istmo de Tehuantepec. De ahí vuelan sobre tierra a lo largo de la costa del Pacífico hasta el Perú y Chile. Durante el invierno acá pasan

por una muda completa de plumas y siguen la misma ruta de regreso. Son la única especie de gaviota que pasan por dos mudas completas de plumas, que son necesarias para afrontar una migración de 8000 kilómetros de vuelo.



- **Gaviotín Dominicana:** También llamado Gaviotín Elegante, es un ave mediana (41 cm) pero más pequeño que la mayoría de las gaviotas y de apariencia más estilizada y alargada al volar al tener las alas más en punta que las gaviotas. Tiene el cuerpo color blanco y el macho en plumaje muestra una corona negra despelucada que va desde la parte posterior del ojo (superciliar) hasta la parte posterior cabeza. Los machos en plumaje reproductor tienen la parte superior del cuerpo de un gris azulado pálido, rabadilla blanca y cola blanca, muy ahorquillada. La parte inferior de sus alas son blancas, con las puntas de las primarias de color oscuro. Tiene el pico más largo que la cabeza y con la punta orientada hacia abajo, de color naranja o amarillo anaranjado aclarándose hacia la punta. Es de ojos negros y patas negras. Se le puede confundir con el Gaviotín Real (48 cm) del que se diferencia por su menor tamaño, por su vuelo más estilizado y ligero, corona proporcionalmente más larga y patas más cortas. Se alimenta de peces que captura al vuelo en el mar. El Gaviotín Elegante se reproduce en colonias muy numerosas en playas arenosas de las costas de California, Baja California y México, desde donde migra hasta las costas de Ecuador, Perú y Chile a partir de Agosto para pasar el verano y regresa a Norteamérica en Marzo. Se estima la población mundial en 30 a 50,000 parejas en reproducción.



- **Guanay:** Puela las costas de Chile, Perú y Ecuador. Es vagante en las aguas del Océano Pacífico de Colombia, Panamá y extremo sur de la Argentina. Mide 68 centímetros de largo. Su cabeza, cuello, alas y dorso son de color negro mientras que la garganta, base del cuello, pecho y abdomen son blancos. En estado adulto tiene una zona desnuda de color rojo alrededor del ojo. Su pico es gris con base rojiza y sus patas rosadas. Se alimenta de anchovetas, y su guano sirve como abono. Es el ave guanera por excelencia. Su guano se emplea en la agricultura como fertilizante por su alto contenido de nitrógeno.



- **Huairavo:** Es una garza rechoncha y de tamaño medio (entre 60 y 65 cm). Es notable la escasa longitud de su cuello, si lo comparamos con el de otras garzas, como la garza real o la garceta común. Se caracteriza por sus ojos de color rojo intenso. El plumaje de las partes inferiores es principalmente blanquecino grisáceo. El cuello puede ser blanco o gris claro. El rostro, garganta y vientre son de color blanco puro. El píleo y nuca y espalda son de color negruzco, aunque de tonalidad cambiante, y las alas son de color gris. A los adultos les salen de la nuca dos o tres plumas blancas largas y estrechas, algo más largas en el macho que en la hembra. Las patas y pies son de color amarillo pálido (algo más intenso en época de cría). El pico, robusto pero no excesivamente largo, es verdoso en la base y negro en la parte superior. Los juveniles muestran un plumaje vetado en marrón y blanco, así como ojos de color miel o amarillos. No presentan las plumas de la nuca hasta el primer año de vida. Es un ave de costumbres eminentemente crepusculares y nocturnas, aunque en época de cría es posible verla en actividad a la luz del día.



- **Pilpilén Negro:** Es un ave negra con algunos tonos marrones. Tiene los ojos amarillos con el borde rojo y las patas rosadas. El pico es largo y rojo anaranjado y achatado por los costados, característica de esta familia de aves que han desarrollado para poder abrir conchas o extraer crustáceos adheridos a las rocas. Se distribuye, con dos subespecies, en playas rocosas marinas del occidente y sur de América; en Norteamérica, desde las islas Aleutianas en Alaska, hasta la península de Baja California en México y en Sudamérica desde Ecuador hasta el cabo de Hornos y la Patagonia argentina y como vagante hasta Uruguay. Se alimenta de ostras que abre con su pico y de invertebrados marinos.



- **Piquero:** Habita en las costas de Chile y Perú. Es una de las principales aves guaneras del pacífico sudamericano. Mide aproximadamente 75 cm de largo. Tiene la cabeza, cuello, pecho y vientre de color blanco, mientras que sus alas y cola son de color marrón oscuro. Su pico es gris oscuro y sus cortas patas son de un tono azulado. Se alimenta de peces, a los que caza lanzándose en picada sobre los cardúmenes.



- **Churrete Costero:** Habita en el cono sur Sudamericano. Tiene una longitud de 27 cm. Coloración general café ahumada oscura con fina línea superciliar acanelada clara. Por debajo es pardo ahumado claro con estrías longitudinales claras que desaparecen hacia las partes inferiores. Garganta y lados del cuello de color blanco. Las alas presentan una banda café amarillenta siendo las primarias negruzcas. Pico negro y patas gris oscuras. Es común verlo volar entre los roqueros e incluso sobre el mar, emitiendo su fresco trino y buscando todo tipo de invertebrados e insectos que le sirven de alimento. Nidifica desde septiembre, entre las rocas o riscos de la costa. También construye cuevas en pendientes o barrancos. Coloca 3, a veces 4 huevos de color blanco.

